

การป้องกัน



หลังสัมผัสเนื้อหมูให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่
และน้ำสะอาดทุกครั้ง



ไม่ใช้ชียงและมีดกับเนื้อหมูดิบ
และอาหารปรุงสุกร่วมกัน



ในการปรุงเนื้อหมูให้ใช้น้ำต้มเดือด หรือใช้
ความร้อนอย่างน้อยที่ 70 องศาเซลเซียส
10 นาที หรือสังเกตเนื้อหมูที่ปรุงว่า
ปราศจากสีแดง

การแนะนำผู้ป่วย



หากมีอาการ

มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับประวัติ
เลี้ยงหมู ช่างแหละหมู หรือสัมผัสเนื้อหมู
มือเปล่า หรือรับประทานเนื้อ เลือด เครื่องใน
หรือผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
ให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 3 วัน



ด้วยความห่วงใย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลแม่หล่าย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กินหมูดิบเสี่ยง
ไข้หูดับ



สาเหตุ

1 เกิดจากการกินเนื้อหมู เลือดหมู เครื่องในหมู ผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ



2 ร่างกายมีบาดแผล และไปสัมผัสหมู ที่มีเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส



อาการ



มีไข้




ปวดกลัมน้ำ



อาเจียน



ประสาทหูอักเสบ
จนหูหนองถาวร



ชาตะ
มรณะ

ในรายที่มีอาการรุนแรง
อาจเสียชีวิต

การป้องกัน



ไม่รับประทานอาหารจากเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จากหมูดิบหรือสุกๆ ดิบๆ



เลือกซื้อเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้



เมื่อมีแผลที่มือห้ามสัมผัสเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จากหมูโดยตรง